

Effecol 3350

Epsilon Health

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Μακρογόλη 3350

24 φακελίσκοι των 13,3 g

Χρήσιμο σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Το EFFECOL 3350 Epsilon Health είναι ένα υπακτικό ιατροτεχνολογικό βοήθημα, που μέσω της ωσμωτικής του δράσης, ρυθμίζει την κινητικότητα του εντέρου με φυσικό τρόπο. Δεν απορροφάται, ούτε ζυμώνεται από το έντερο, δεν ερεθίζει το βλεννογόνο και απομακρύνεται με τα κόπρανα. Το EFFECOL 3350 Epsilon Health ενδείκνυται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας και περιστασιακά ακανόνιστων κινήσεων του εντέρου. Στην πράξη, χάρη στη συγγένεια του με το νερό, το EFFECOL 3350 Epsilon Health μαλακώνει τα κόπρανα διευκολύνοντας τις κενώσεις χωρίς να προκαλεί κράμπες ή κοιλιακό άλγος ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η αποτελεσματικότητα του δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

1.1 Συστατικά

Κάθε φακελίσκος περιέχει 13,125 g Μακρογόλης 3350.
Έκδοχα: silicon dioxide, flavor, saccharin sodium.

2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το EFFECOL 3350 Epsilon Health είναι σκόνη σε φακελίσκους για την προετοιμασία πόσιμου εναιωρήματος.
Το κουτί περιέχει 24 μίας χρήσης φακελίσκους των 13,3 g έκαστος.

3. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 12 ετών: 1 φακελίσκος (13,3g) 1 με 3 φορές την ημέρα. Σε περιπτώσεις παρατεταμένης χρήσης είναι δυνατή η μείωση της δοσολογίας στους 1-2 φακελίσκους ημερησίως. Ανοίξτε το φακελίσκο και διαλύστε το περιεχόμενο του σε 125 ml (περίπου ένα ποτήρι) νερό.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην λάβετε το EFFECOL 3350 Epsilon Health σε περιπτώσεις:

- εντερικής στένωσης
- εντερικής διάτρησης
- Φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (π.χ. νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα)

Μην λάβετε το προϊόν σε περιπτώσεις εντερικής απόφραξης.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία σχετικά με την λήψη του προϊόντος κατά την κύηση και γαλουχία, επομένως μπορείτε να λάβετε το EFFECOL 3350 Epsilon Health μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο μετά από συμβουλή του ιατρού σας.

Σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης. Η διάρκεια αγωγής με το EFFECOL 3350 Epsilon Health δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες. Σε περιπτώσεις όμως όπου κρίνεται απαραίτητο, η αγωγή μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να είναι αναγκαία σε περιπτώσεις επίμονης ή χρόνιας δυσκοιλιότητας. Αυτού του τύπου η δυσκοιλιότητα μπορεί να οφείλεται στη λήψη ναρκωτικών παυσίπονων (οπιοειδή) και στην λήψη αγωγής για Parkinson (αντιχολινεργικά) ή να σχετίζεται με ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και το Parkinson.

5. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε δόσεις απαραίτητες για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος δεν έχει αναφερθεί ποτέ εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ανεπιθύμητες ενέργειες που μερικές φορές ενδέχεται να εμφανιστούν, είναι γαστρεντερικές διαταραχές, βορβορυγμοί, κοιλιακό άλγος, ναυτία και ήπια διάρροια (ειδικά στην αρχή). Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (ερύθημα,

κνίδωση). Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας, ακόμη και αν αυτή είναι διαφορετική από αυτές που αναγράφονται εδώ. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση μην πάρετε διπλή δόση, αλλά περιμένετε και πάρετε την επόμενη.

6. ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας τα ακόλουθα αποτελέσματα ενδέχεται να εμφανιστούν: έντονος πόνος, διάταση της κοιλίας, διάρροια και έμετος που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανισορροπία των ηλεκτρολυτών. Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

7. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, αλλά είναι σκόπιμο ότι η λήψη του προϊόντος να γίνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά τη χορήγηση άλλων φαρμάκων που λαμβάνονται από το στόμα ή οποιονδήποτε άλλων φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των ομοιοπαθητικών), ή συμπληρωμάτων διατροφής, λόγω της οσμωτικής δράσης της μακρογόλης και της αύξησης της ταχύτητας της γαστρεντερικής διέλευσης, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το EFFECOL 3350 Epsilon Health στην περίπτωση άλλων θεραπειών σε εξέλιξη.

8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κρατήστε το προϊόν σε μέρος ξηρό, μακριά από πηγές θερμότητας και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ανοίξτε τους φακελάκιους μόνο όταν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιήσετε τους φακελάκιους στην περίπτωση που είναι κατεστραμμένοι. Κρατήστε το προϊόν μακριά από μέρη που βλέπουν και μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά, σε θερμοκρασία δωματίου (<25°C).

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε παιδιά κάτω των 12 ετών.
- Κατά την κύηση και γαλουχία μπορείτε να λάβετε το προϊόν μόνο με την συμβουλή του ιατρού σας.

- Μην υπερβαίνεται την συνιστώμενη ημερήσια δόση, καθώς υψηλότερες δόσεις ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Μην λαμβάνετε το προϊόν σε περίπτωση δυσανεξίας σε αυτό.
- Μην λάβετε το προϊόν σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στα συστατικά του και την πολυαιθυλενογλυκόλη.
- Κάθε φακελάκιος χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και πρέπει να ανοίγεται μόνο πριν την λήψη του.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν αποθηκευμένο στον άθικτο περιέκτη του.

11. ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ)

Κάθε προϊόν του οποίου η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει θα πρέπει να απορρίπτεται με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του απευθείας στο περιβάλλον.



 SIIT S.r.l., Via Ariosto 50/60,
Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

Αντιπρόσωπος:

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε. – “EPSILON HEALTH”

Κ. Παλαμά 4 – 555 34, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. +30 2310 941150, +30 2310 941112, Fax. +30 2310 922553
info@epsilon-health.gr, www.epsilon-health.gr

Τελευταία αναθεώρηση: Μάρτιος 2018