

Silactis fast

Σιμεθικόνη &
Ενεργός Άνθρακας

Epsilon Health

20 διπλής στοιβάδας δισκία

Ανακουφίζει από τα συμπτώματα που σχετίζονται με το φούσκωμα και το μετεωρισμό Εξουδετερώνει τα γαστρεντερικά αέρια

1. Προσδιορισμός, σύσταση και χρήση του ιατροτεχνολογικού βοήθηματος

Το **Silactis Fast Epsilon Health** είναι ένα ιατροτεχνολογικό βοήθημα χρήσιμο για την ανακούφιση από τα συμπτώματα που σχετίζονται με το φούσκωμα και τον εντερικό τυμπανισμό που οφείλονται στη συγκέντρωση αερίων.

Το Silactis Fast Epsilon Health αντιμετωπίζει τις κράμπες και τους σχετιζόμενους πόνους και προλαμβάνει το μετεωρισμό και το φούσκωμα.

1.1 Μηχανισμός δράσης

Η αποτελεσματικότητά του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος οφείλεται στις αντιφριτικές ιδιότητες της σιμεθικόνης σε συνδυασμό με τις προσροφητικές ιδιότητες του άνθρακα ενάντια στα εντερικά αέρια: η δράση του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος οφείλεται αποκλειστικά σε μηχανικά φαινόμενα. Τα διπλής στοιβάδας δισκία απελευθερώνουν περίπου το 50% των συστατικών τους στο στομάχι μέσα σε 15 λεπτά μετά την κατάποση του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος, ενώ η πλήρης διασπορά του δισκίου ολοκληρώνεται στο εντερικό περιβάλλον μέσα σε 1 ώρα. Τα συστατικά δεν απορροφώνται από τον γαστρεντερικό σωλήνα και δεν εμποδίζουν την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών.

1.2 Συστατικά

Κάθε δισκίο περιέχει:

- Σιμεθικόνη 50mg
- Ενεργό Άνθρακα 300mg

Έκδοχα: maltodextrin, sucrose, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, polyvinylpyrrolidone, colloidal silica, sodium croscarmellose, polyvinylpolypyrrolidone, glycerol behenate, silicon dioxide, magnesium stearate

2. Συσκευασία

Κάθε κουτί περιέχει 20 μιας χρήσης, διπλής στοιβάδας δισκία.

3. Δοσολογία και τρόπος χρήσης

Ενήλικες: 4 δισκία την ημέρα, κατά προτίμηση μετά από κυρίως γεύματα.

Βγάλετε το δισκίο από το blister και λάβετε το μαζί με ένα ποτήρι νερό.

4. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Με τη συνιστώμενη δοσολογία μπορεί να παρατηρηθεί φαιά χρώση των κοπράνων, λόγω της παρουσίας άνθρακα. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και στερείται παθολογικής σημασίας. Καμία σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια δεν έχει εμφανιστεί μετά από ένα μέσο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρήσης. Το προϊόν δεν επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα συγκέντρωσης. Ανεπιθύμητες ενέργειες διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται μπορεί να εμφανιστούν: συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση εμφάνισης μη αναμενόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

5. Αλληλεπιδράσεις με συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα

Οι προσροφητικές ιδιότητες του άνθρακα και της σιμεθικόνης ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα άλλων φαρμάκων που χορηγούνται ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης θεραπείας με άλλα φάρμακα συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το προϊόν.

Η σιμεθικόνη μπορεί να επηρεάσει τη δράση ορισμένων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά, όπως το guaiac gum.

6. Συνθήκες αποθήκευσης

Κρατήστε το Silactis Fast Epsilon Health σε μέρος ξηρό και μακριά από πηγές θερμότητας ή την άμεση ηλιακή ακτινοβολία: ανοίξτε το blister μόνο όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας. Κρατήστε μακριά από μέρη που βλέπουν και μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά. Φυλάσσετε το ιατροτεχνολογικό βοήθημα σε θερμοκρασία κάτω από τους 25 °C.

7. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μην κορηγείτε το προϊόν σε ηλικίες μικρότερες των 14 ετών.
- Κρατήστε το μακριά από μέρη που βλέπουν και μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στο κουτί.
- Μην λάβετε τα δισκία σε ύπτια θέση.
- Μην λάβετε τα δισκία σε περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας.
- Κάθε δισκίο χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και πρέπει να αποσπάται από τη συσκευασία ακριβώς πριν από τη λήψη του. Μην χρησιμοποιήσετε δισκία που έχουν χρησιμοποιηθεί μερικώς (θρυμματισμένα ή σπασμένα) ή που έχουν ήδη αποσπαστεί από το blister σε άγνωστο χρόνο, καθώς αυτή η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση γαστρικής ή εντερικής βλάβης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιπτώσεις εντερικής απόφραξης.

- **Σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού, χρησιμοποιείτε το ιατροτεχνολογικό βοήθημα μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο και μετά από συμβουλή του γιατρού σας.**
- Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δοσολογία, καθώς υψηλότερες δόσεις ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
- **Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες.**
- **Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.**
- Μην λάβετε το προϊόν σε περίπτωση δυσανεξίας σε αυτό.
- Μην λάβετε το προϊόν σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στα συστατικά του.

8. Ημερομηνία λήξης

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν κατάλληλα αποθηκευμένο στον άθικτο περιέκτη του.

9. Απορριψη

Κάθε προϊόν του οποίου η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση μην απορρίπτεται το προϊόν ή τη συσκευασία του απευθείας στο περιβάλλον.

Τελευταία αναθεώρηση: Απρίλιος 2019



SIIT srl

Via Ariosto 50/60, 20090

Trezzano sul Naviglio, (MI) ITALY



Αντιπρόσωπος:

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ I.K.E. - EPSILON HEALTH

K. Παλαμά 4, 55534, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

T.: +30 2310 941150, +30 2310 941112

F.: +30 2310 922553

info@epsilon-health.gr

www.epsilon-health.gr

Epsilon Health

