

Βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης PINETREE

Χαρακτηριστικά ⁵	VEKLURY (n=541)	εικονικό φάρμακο (n=521)
Διάμεση ηλικία ± SD	50±15	51±15
Ηλικιακή κατηγορία (%)		
≥60 χρονών	83 (29.7)	87 (30.7)
<18 χρονών	3 (1.1)	5 (1.8)
Θηλυκό γένος κατά τη γέννηση (%)	131 (47.0)	138 (48.8)
Κατοικία στις ΗΠΑ (%)	264 (94.6)	267 (94.3)
Φυλή ή εθνικότητα (%)*		
Λευκοί	228 (81.7)	224 (79.2)
Μαύροι	20 (7.2)	22 (7.8)
Ιθαγενείς Αμερικανοί ή Ιθαγενείς της Αλάσκα	15 (5.4)	21 (7.4)
Ασιάτες, Ιθαγενής της Χαβάης ή από τα Νησιά του Ειρηνικού	7 (2.5)	7 (2.5)
Ισπανόφωνοι/Λατίνοι (%)	123 (44.1)	112 (39.6)
Άλλο	3 (1.1)	2 (0.7)
Δείκτης μάζας σώματος ± SD	31.2±6.7	30.8±5.8
Συνοδά νοσήματα (%)		
Διαβήτης Τύπου 2	173 (62.0)	173 (61.1)
Παχυσαρκία	154 (55.2)	156 (55.1)
Υπέρταση	138 (49.5)	130 (45.9)
Χρόνια πνευμονοπάθεια	67 (24.0)	68 (24.0)
Καρκίνος	12 (4.3)	18 (6.4)
Καρδιαγγειακή ή εγκεφαλοαγγειακή νόσος	20 (7.2)	24 (8.5)
Ανοσοκαταστολή	14 (5.0)	9 (3.2)
Χρόνια νεφρική νόσος, ήπια ή μέτρια	7 (2.5)	11 (3.9)
Χρόνια ηπατική νόσος	1 (0.4)	1 (0.4)
Διαμονή σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα (%)	8 (2.9)	7 (2.5)
Μέση διάρκεια των συμπτωμάτων από την πρώτη έγχυση - Ημέρες (IQR)	5 (3–6)	5 (4–6)
Διάμεσος χρόνος από την επιβεβαίωση RT-PCR της νόσου COVID-19 - Ημέρες (IQR)	2 (1–3)	3 (1–4)
Μέση καταγραφή ιικού φορτίου ρινοφαρυγγικού RNA COVID-19, αντίγραφα/ml [†] ± SD	6.31±1.75	6.28±1.79

Προσαρμογή από Gottlieb RL, et al. N Engl J Med. 2022.

* Η φυλή και η εθνικότητα αναφέρθηκαν από τους ασθενείς. Οι ασθενείς θα μπορούσαν να είχαν περισσότερες από μία φυλές ή εθνικότητες.⁵

[†] Εμφανίζονται δεδομένα για το σετ ιολογικής ανάλυσης, το οποίο ορίζεται στο σχέδιο στατιστικής ανάλυσης: 215 από 279 ασθενείς (77,1%) στην ομάδα VEKLURY και 213 από 283 ασθενείς (75,3%) στην ομάδα εικονικού φαρμάκου.⁵