


Δυνητικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντικών φαρμάκων έναντι της COVID-19, σε νοσηλευόμενους ασθενείς στις ΗΠΑ

Μάιος 2020-Δεκέμβριος 2022

Ποσοστό νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 με δυνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων σχετιζόμενες με αντικές θεραπείες*



Adapted from Mozaffari E, et al. Poster 156, Presented at SHM. 12–15 April 2024.

Οι μελέτες σε πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να ερμηνεύονται με βάση τον τύπο και το μέγεθος της πηγής των δεδομένων και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να ελαχιστοποιούνται οι παράγοντες σφάλματος ή η μεροληψία. Τα δεδομένα από πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με προσοχή, στο πλαίσιο όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Τα αποτελέσματα ποικίλουν μεταξύ των μελετών σε πραγματικές συνθήκες.

CCI: Δείκτης Συννοσηρότητας Charlson, COVID-19: νόσος κορωνοϊού 2019, D: ημέρα, DAA: απ'ευθείας δρώντα αντι-ϊικά, DDI: φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις

1. Mozaffari E, et al. Poster 156. Presented at SHM. 12–15 April 2024.
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος VEKLURY, Αύγουστος 2025

* Τα φάρμακα που αναγνωρίστηκαν να έχουν δυνητικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις με τα nirmatrelvir/ritonavir, VEKLURY και molnupiravir εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων PINC AI, σε περιγραφική σύνοψη και στη συνέχεια με αναφορά για το σύνολο και για τις υποομάδες ενδιαφέροντος. Από τους 788.238 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για COVID-19, το 53% ήταν 65 ετών και το 31% είχε CCI ≥ 3. Η πλειονότητα (93%) των ασθενών είχαν υποκείμενα νοσήματα, τα οποία τους έθεταν σε υψηλό κίνδυνο για σοβαρή COVID-19. Η επίπτωση της "αντένδειξης" ή της "αποφυγής συγχορήγησης" ήταν υψηλότερη σε αυτούς που είχαν ηλικία ≥ 65 ετών (68%), με CCI ≥ 3 (78%) και με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου (55%)¹. Τα αντενδεικνυόμενα φάρμακα οφορούσαν κυρίως τα nirmatrelvir/ritonavir, ενώ ελάχιστες δυνητικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις παρατηρήθηκαν για το VEKLURY και καμία για το molnupiravir.¹ Η συγχορήγηση του VEKLURY με φωσφορική φωσφορική χλωροκίνη ή με θειική υδροξυχλωροκίνη δεν συστήνεται λόγω του κινδύνου για μειωμένη αντι-ϊκή δραστηριότητα.²