

ΚΑΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Rivaroxaban/RAFARM 2,5 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να σημειώσετε τη συνταγογραφημένη δόση)

Rivaroxaban/RAFARM 10 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να σημειώσετε τη συνταγογραφημένη δόση)

Rivaroxaban/RAFARM 15 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να σημειώσετε τη συνταγογραφημένη δόση)

Rivaroxaban/RAFARM 20 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να σημειώσετε τη συνταγογραφημένη δόση)

- ♦ Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή
- ♦ Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Rivaroxaban/RAFARM (ριβαροξαμπάνη)

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / καταστάσεις:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ενημερώσετε:

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

Παρακαλείστε να ενημερώσετε επίσης:

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση:

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

- ♦ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Rivaroxaban/RAFARM

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Rivaroxaban/RAFARM;

- ♦ Το Rivaroxaban/RAFARM αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.
- ♦ Το Rivaroxaban/RAFARM θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη προστασία από θρόμβους στο αίμα, μην παραλείψετε καμία δόση.
- ♦ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/RAFARM χωρίς πρώτα να μιλήσετε στον ιατρό σας, καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων στο αίμα μπορεί να αυξηθεί.
- ♦ Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το Rivaroxaban/RAFARM.
- ♦ Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το Rivaroxaban/RAFARM πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον ιατρό μου;

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το Rivaroxaban/RAFARM, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους.

Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/RAFARM εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας. Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα αιμορραγίας, όπως είναι τα παρακάτω:

- ♦ πόνος
- ♦ οίδημα ή δυσφορία
- ♦ πονοκέφαλος, ζάλη ή αδυναμία
- ♦ ασυνήθιστοι μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
- ♦ έμμηνος ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
- ♦ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
- ♦ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

Πώς λαμβάνεται το Rivaroxaban/RAFARM;

- ♦ Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη προστασία, το Rivaroxaban/RAFARM
 - 2,5 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
 - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό