

Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς

Blomensy 2,5 mg

Blomensy 10 mg

Blomensy 15 mg

Blomensy 20 mg

6954152A



- Έχετε πάντα μαζί σας αυτή την κάρτα
- Επιδείξτε αυτήν την κάρτα σε κάθε γιατρό ή οδοντίατρο πριν από τη θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Blomensy (ριβαροξαμπάνη)

Όνοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / παθήσεις:



Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενημερώστε:

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

Ενημερώστε επίσης:

Όνοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:

Σχέση:

Πληροφορίες για τους παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης:

- Οι τιμές INR δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Blomensy.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το Blomensy;

- Το Blomensy αραιώνει το αίμα, εμποδίζοντας τον σχηματισμό θρόμβων στο αίμα.
- Το Blomensy πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας.

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη προστασία από σχηματισμό θρόμβων στο αίμα, **μην παραλείπετε ποτέ μια δόση.**

- Δεν πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε το Blomensy χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας, καθώς ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων στο αίμα μπορεί να αυξηθεί.
- Ενημερώστε τον πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για οποιαδήποτε άλλα φάρμακα λαμβάνετε ήδη, λάβατε πρόσφατα ή σκοπεύετε να αρχίσετε να λαμβάνετε, προτού ξεκινήσετε το Blomensy.

- Ενημερώστε τον πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ότι λαμβάνετε Blomensy πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε πρέπει να ζητήσω συμβουλές από τον πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;

Όταν λαμβάνετε ένα μέσο αραίωσης αίματος όπως το Blomensy, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές του. Η αιμορραγία είναι η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε να λαμβάνετε το Blomensy εάν γνωρίζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το συζητήσετε πρώτα

με τον γιατρό σας. Ενημερώστε αμέσως τον πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εάν έχετε ενδείξεις ή συμπτώματα αιμορραγίας όπως τα ακόλουθα:

- πόνος
- οίδημα ή δυσφορία
- κεφαλαλγία, ζάλη ή αδυναμία
- ασυνήθιστοι μώλωπες, ρινορραγίες, αιμορραγία των ούλων, κοψίματα που χρειάζονται πολύ χρόνο για να σταματήσει η αιμορραγία
- εμμηνορροϊκή ροή ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι εντονότερη από το φυσιολογικό
- αίμα στα ούρα σας που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόκκινα ή μαύρα κόπρανα

- βήχας με αίμα ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με υπολείμματα καφέ

Πώς λαμβάνω το Blomensy;

- Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία, το Blomensy
 - 2,5 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή
 - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή
 - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με τροφή
 - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με τροφή