


# ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΕΡΕΤ® ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΟΣΔ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ DMARD<sup>1</sup>

Η θεραπεία με Kineret® καταδεικνύει αριθμητικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της ΑΟΣΔ έναντι των DMARD<sup>\*1</sup>

Ποσοστά ύφεσης με την πάροδο του χρόνου<sup>\*\*1</sup>



\* Η αποτελεσματικότητα του Kineret® έναντι των DMARD έχει αναφερθεί σε μια δημοσιευμένη, διάρκειας 24 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη 22 ασθενών με εξαρτώμενη από γλυκοκορτικοειδή ανθεκτική ΑΟΣΔ.<sup>1</sup>

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η ύφεση σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια:<sup>1</sup> • **απουξία** (θερμοκρασία σώματος  $\leq 37^{\circ}\text{C}$ , μετρημένη δύο φορές από τη μασχάλη) επί απουσίας χορήγησης ΜΣΑΦ εντός 24 ωρών πριν από τη μέτρηση, • **μείωση της CRP και της φερριτίνης** στα όρια αναφοράς, φυσιολογικές τιμές για οιδηματώδεις **ευαίσθητες στην αφή αρθρώσεις**.

<sup>\*\*</sup> Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο δεν επετεύχθη, ωστόσο, υπήρχε μια αριθμητική διαφορά σε όλα τα χρονικά σημεία.