



Το Kineret® έχει ιστορικό ασφάλειας που βασίζεται σε περισσότερα από 20 έτη κλινικής εμπειρίας¹

- Το προφίλ ασφάλειας του Kineret® στη νόσο Still είναι παρόμοιο με εκείνο των ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, των συνδρόμων CAPS και του FMF.¹
- Ο χρόνος ημίσειας ζωής του Kineret® είναι 4 έως 6 ώρες και δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης με βάση την ηλικία ή το φύλο.¹

Το σύνδρομο διέγερσης μακροφάγων (MAS) είναι μια γνωστή, απειλητική για τη ζωή διαταραχή που μπορεί να αναπτυχθεί σε ασθενείς με νόσο του Still¹

- Οι γιατροί θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε συμπτώματα λοίμωξης ή επιδείνωσης της νόσου του Still, καθώς αποτελούν γνωστούς ερεθιστικούς παράγοντες για ανάπτυξη MAS.¹
- Σε περίπτωση εκδήλωσης, ή υποψίας, MAS, η αξιολόγηση και η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.¹
- Εάν η θεραπεία με Kineret® συνεχίζεται κατά τη διάρκεια σοβαρών λοιμώξεων για τη μείωση του κινδύνου έξαρσης της νόσου, απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση.¹



Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με το Kineret® είναι **αντίδραση στη θέση ένεσης**, που αναφέρεται κυρίως ως ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας.¹

PA = ρευματοειδής αρθρίτιδα, CAPS = περιοδικά σύνδρομα σχετιζόμενα με την κρουσπυρίνη, MAS = σύνδρομο διέγερσης μακροφάγων