

# ΣΥΧΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ STILL<sup>1-3</sup>

υψηλός πυρετός, συχνά  
σε καθημερινή βάση

αρθραλγία ή αρθρίτιδα

παροδικό δερματικό  
εξάνθημα χρώματος σομόν

διογκωμένο ήπαρ  
ή/και σπλήνας

ορογονίτιδα (φλεγμονή του  
βλεννογόνου των οργάνων)

λεμφαδενοπάθεια

πονόλαιμος (αυξημένη  
συχνότητα σε ασθενείς με  
AOSD)

παθολογικά εργαστηριακά  
ευρήματα, π.χ. αύξηση των  
αντιδρώντων οξείας φάσης  
(ΤΚΕ, CRP, φερριτίνη ορού)

---

**AOSD** = νόσος του Still των ενηλίκων, **CRP** = C- αντιδρώσα πρωτεΐνη, **ΤΚΕ** = ταχύτητα καθίζησης ερυθρών.

1. Woo, P. Clin Pract. 2006;2:28–34.
2. Jamilloux Y, et al. Immunol Res. 2015;61(1–2):53–62.
3. Giacomelli R, et al. J Autoimmun. 2018;93:24–36