

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Dabigatran etexilate/Stada καφάκια
ετεξιλική δαβιγατράν

- Αυτή η κάρτα πρέπει να είναι συνέχεια μαζί σας / μαζί με τον φροντιστή
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση

Αγαπητέ ασθενή / φροντιστή παιδιατρικού ασθενούς,

Ο γιατρός σας / ο γιατρός του παιδιού σας ξεκίνησε αγωγή με το Dabigatran etexilate/Stada. Για να χρησιμοποιείτε το Dabigatran etexilate/Stada με ασφάλεια, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τις σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Η κάρτα ασθενούς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη θεραπεία σας / τη θεραπεία του παιδιού σας και αυτή η κάρτα πρέπει να είναι πάντα μαζί σας / μαζί με το παιδί σας ώστε να πληροφορούνται οι επαγγελματίες υγείας ότι λαμβάνετε / το παιδί σας λαμβάνει Dabigatran etexilate/Stada.

Dabigatran etexilate/Stada Πληροφορίες για τους ασθενείς / φροντιστές παιδιατρικών ασθενών

Για τη θεραπεία σας / τη θεραπεία του παιδιού σας

- Το Dabigatran etexilate/Stada αφαιώνει το αίμα. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία υπαρχόντων θρόμβων αίματος ή για την πρόληψη του σχηματισμού επικινδυνών θρόμβων αίματος.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας / του γιατρού του παιδιού σας όταν παίρνετε το Dabigatran etexilate/Stada. Ποτέ μην παραλείπετε μια δόση ή μη σταματήστε τη λήψη του Dabigatran etexilate/Stada χωρίς να ενημερώσετε τον γιατρό σας / τον γιατρό του παιδιού σας.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας / τον γιατρό του παιδιού σας για όλα τα φάρμακα που παίρνετε / που το παιδί σας παίρνει επί του παρόντος.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας / τον γιατρό του παιδιού σας σχετικά με τη λήψη του Dabigatran etexilate/Stada πριν από οποιαδήποτε χειρουργική / επεμβατική πράξη.
- Τα καφάκια Dabigatran etexilate/Stada μπορούν να λαμβάνονται με ή χωρίς τροφή. Το καφάκι πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό. Το καφάκι δεν πρέπει να σπάζεται ή να μασίζεται και τα σφαριδιά δεν πρέπει να αδειάζονται από το καφάκι.

Πότε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή

- Η λήψη του Dabigatran etexilate/Stada μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας / στον γιατρό του παιδιού σας αμέσως εάν παρουσιάσετε / το παιδί σας παρουσιάσει σημεία και συμπτώματα αιμορραγίας όπως: οιδημα (προξενικό), δυσφορία, ασυνήθιστο πόνο ή κεφαλαλγία, ζάλη, ωχρότητα, αδυναμία, ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, αιμορραγία από τα ούλα, κοψίματα που αιμορραγούν για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, μη φυσιολογική έμμηνο ρύση ή κολπική αιμορραγία, αίμα στα ούρα τα οποία μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόκκινα/μαύρα κόπτρανα, βήχα με αίμα, έμετο με αίμα ή υλικό που μοιάζει με αλεσμένο καφέ.
- Σε περίπτωση ή τραυματισμού, ιδιαίτερα αν χτυπήσει το κεφάλι, ζητήστε επειγόντως ιατρική συμβουλή.
- Μη σταματήσετε τη λήψη του Dabigatran etexilate/Stada χωρίς να ενημερώσετε τον γιατρό σας / τον γιατρό του παιδιού σας, εάν παρουσιάσετε / το παιδί σας παρουσιάσει κασύρα, ναυτία, έμετο, στομαχική δυσφορία, φούσκωμα ή πόνο στην κοιλιά.

Dabigatran etexilate/Stada Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας

- Το Dabigatran etexilate/Stada είναι ένα από του στόματος αντιπηκτικό (άμεσος αναστολέας της θρομβίνης).
- Ενδέχεται να απαιτείται διακοπή του Dabigatran etexilate/Stada πριν από χειρουργικές ή άλλες επεμβατικές πράξεις.
- Σε περίπτωση μειζόνων αιμορραγικών επεισοδίων, το Dabigatran etexilate/Stada πρέπει να διακόπτεται άμεσα.
- Διατίθεται ειδικός παράγοντας αναστροφής (ιδαρουσιζουμάρπη) για ενήλικους ασθενείς. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του ειδικού παράγοντα αναστροφής ιδαρουσιζουμάρπη δεν έχουν τεκμηριωθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς. Για λεπτομέρειες και περισσότερες συμβουλές σχετικά με τον ανταγωνισμό της αντιπηκτικής δράσης του Dabigatran etexilate/Stada, ανατρέξτε στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Dabigatran etexilate/Stada και της ιδαρουσιζουμάρπης.
- Το Dabigatran etexilate/Stada αποβάλλεται κυρίως μέσω των νεφρών·πρέπει να διατηρείται επαρκής διούρηση. Το Dabigatran etexilate/Stada υπόκειται σε αιμοκάθαρση.

Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το πεδίο ή ζητήστε από τον γιατρό σας / τον γιατρό του παιδιού σας να το κάνει.

Στοιχεία ασθενούς

Όνοματεπώνυμο ασθενούς

Ημερομηνία γέννησης

Ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή

Δόση Dabigatran etexilate/Stada

9359121
2410
GR

STADA

STADA

Produkt/Product: **DABIGATRAN HCA SD GR:IFL**

STADA Mat.-Nr./Mat.-No.: **9359121** DZ: **2410**

STADA Art.-Nr./Art.-No.: **172235, 172236**

Hersteller/Manufacturer: **Galenicum Health S.L.U./SAG**

Hersteller Art.-Nr./ Manufacturer Art.-No.: -

Format/Size: **85 x 440 mm**

Schriftgröße/Font-size: **8 pt - 9 pt**

PZN/EAN: -

Pharma-Code: -

Flattermarke/Collating mark:

1. Farbe/Colour: **■ 100% Black**

2. Farbe/Colour:

3. Farbe/Colour:

4. Farbe/Colour:

5. Farbe/Colour:

6. Farbe/Colour:

7. Farbe/Colour:

8. Farbe/Colour:

Version: **RZ 2. Loop** Datum/Date: **22.11.2024**

Agentur/Agency: **STADA Agency**

Grafik erstellt von/Graphic made by: **T.D.**

Aktueller Umlauf/Current loop: **T.D.**

Genehmigt/Approved

