

**ΚΑΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**

[Δισκία Rivaroxaban/STADA 2,5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg / συσκευασία έναρξης θεραπείας ]

Κάρτα ενημέρωσης ασθενούς

**Rivaroxaban/STADA 2,5 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

**Rivaroxaban/STADA 10 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

**Rivaroxaban/STADA 15 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

**Rivaroxaban/STADA 20 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

♦ Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή

♦ Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με  
Rivaroxaban/STADA (ριβαροξαμπάνη)

Όνομα:

1370148 GR

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / καταστάσεις:



**Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ενημερώσετε:**

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

**Παρακαλείστε να ενημερώσετε επίσης:**

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση:





## Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

- ♦ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν οξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Rivaroxaban/STADA.

## Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Rivaroxaban/STADA;

- ♦ Το Rivaroxaban/STADA αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.
- ♦ Το Rivaroxaban/STADA θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, **μην παραλειφετε καμία δόση.**
- ♦ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/STADA πριν ενημερώσετε τον ιατρό σας καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.
- ♦ Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το Rivaroxaban/STADA.
- ♦ Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το Rivaroxaban/STADA πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

## Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον ιατρό μου;

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το Rivaroxaban/STADA είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/STADA εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας. Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- ♦ πόνο
- ♦ οιδημα ή δυσφορία
- ♦ πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία
- ♦ ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοφίματα που αργεί να σταματήσει
- ♦ έμμηνο ρύση ή κολπική αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
- ♦ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
- ♦ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ



## Πώς λαμβάνεται το Rivaroxaban/STADA;

- ♦ Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία, το Rivaroxaban/STADA
- 2,5 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
- 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
- 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
- 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό

