

Deferasirox/Teva

**Σημαντικές πληροφορίες για τους ασθενείς/ φροντιστές
για την ελαχιστοποίηση σημαντικών κινδύνων**

Όνομα:

Ημερομηνία:

Παρακαλούμε διατηρείτε αυτό το έγγραφο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Αυτό το φυλλάδιο προορίζεται μόνο για ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί το Deferasirox/Teva. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ορθού τρόπου λήψης του Deferasirox/Teva και των λόγων για τους οποίους η παρακολούθηση της θεραπείας σας είναι σημαντική.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Πίνακας περιεχομένων

- Λεξιλόγιο
- Πληροφορίες για το ιστορικό μου
- Έναρξη θεραπείας με Deferasirox/Teva
- Τι είναι το Deferasirox/Teva;
- Πώς λειτουργεί αυτό το φάρμακο;
- Γιατί μου συνταγογραφήθηκε αυτό το φάρμακο;
- Πώς λαμβάνω το Deferasirox/Teva;
- Πώς θα παρακολουθείται η θεραπεία μου;
- Αυτό το φάρμακο έχει ανεπιθύμητες ενέργειες;
- Τι γίνεται με τα άλλα φάρμακα;
- Η πρόοδός μου με το Deferasirox/Teva
- Πώς να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Μείζων β-θαλασσαιμία

Κληρονομική διαταραχή του αίματος στην οποία οι ασθενείς δεν έχουν αρκετή φυσιολογική αιμοσφαιρίνη στο αίμα.

Βιοψία

Ιατρική διαδικασία που περιλαμβάνει τη λήψη ενός μικρού δείγματος σωματικού ιστού ώστε να μπορεί να εξεταστεί.

Κρεατινίνη

Προϊόν του μεταβολισμού που παράγεται από τους μύες. Τα υγιή νεφρά φιλτράρουν την κρεατινίνη και άλλα μεταβολικά προϊόντα από το αίμα και αυτά απεκκρίνονται με τη μορφή ούρων.

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών σας.

Φερριτίνη

Το επίπεδο φερριτίνης στο αίμα σας υποδεικνύει την ποσότητα σιδήρου σε αυτό.

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

Η μαγνητική τομογραφία είναι μια απεικονιστική εξέταση των οργάνων του σώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ποσότητας σιδήρου στο ήπαρ και την καρδιά σας.

Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS)

Μια διαταραχή του αίματος που προκαλεί πτώση του αριθμού των υγιών αιμοσφαιρίων.

Άλλες αναιμίες

Χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία – μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων που επηρεάζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια

Τα άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία παράγουν ερυθρά αιμοσφαίρια ασυνήθιστων σχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα επειδή δεν ζουν όσο τα υγιή αιμοσφαίρια και μπορεί να κολλήσουν στα αιμοφόρα αγγεία.

Πληροφορίες για το ιστορικό μου

Οι πληροφορίες για το ιστορικό σας είναι χρήσιμες τόσο για εσάς όσο και για τον γιατρό σας, για τον προγραμματισμό της θεραπείας σας με το Deferasirox/Teva. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις.

Γενικές πληροφορίες

Όνομα:

Επίθετο:

Ημερομηνία γέννησης:

Διάγνωση:

Έχω υποβληθεί σε μεταγγίσεις αίματος; Αν ναι, σε πόσες και πόσο συχνά;

Έχω άλλα προβλήματα υγείας;

Αυτή τη στιγμή λαμβάνω οποιοδήποτε φάρμακο για άλλα προβλήματα υγείας;

Έχω κάποια αλλεργία;

Έναρξη θεραπείας με Deferasirox/Teva

Μπορείτε να αρχίσετε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας μόλις ο γιατρός σας καθορίσει το επίπεδο-στόχο της φερριτίνης (FAIR-it-in) στο αίμα σας και τη δόση του Deferasirox/Teva. Συνεργαστείτε με το γιατρό σας για να συμπληρώσετε τους θεραπευτικούς σας στόχους και άλλες πληροφορίες παρακάτω.

Ημερομηνία

Τρέχουσα τιμή της φερριτίνης στο αίμα μου: _____

Ο στόχος της θεραπείας μου είναι:

Αριθμός έκδοσης: 1.0

Ημερ. έγκρισης ΕΟΦ: Φεβρουάριος 2025

Το βάρος μου: ____

Η μείωση της τιμής της φερριτίνης στο αίμα: ____

Δοσολογία Deferasirox/Teva

- Τι δόση πρέπει να παίρνω κάθε μέρα;
- Πόσα δισκία πρέπει να παίρνω κάθε μέρα;
- Τι ώρα θα παίρνω το φάρμακο κάθε μέρα;

Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν έχετε μη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία (NTDT), η συγκέντρωση σιδήρου στο ήπαρ (LIC) είναι η προτιμώμενη μέθοδος για τη μέτρηση της ποσότητας σιδήρου που έχετε.

Σημειώσεις: Όπως καταγράψετε τυχόν σημειώσεις ή ερωτήσεις από την επίσκεψή σας.

Τι είναι το Deferasirox/Teva;

Το Deferasirox/Teva είναι ένας χηλικός παράγοντας σιδήρου (ή ένας παράγοντας "χηλικοποίησης"), δηλαδή ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην απομάκρυνση της περίσσειας σιδήρου από τον οργανισμό.

Πώς λειτουργεί αυτό το φάρμακο;

Το Deferasirox/Teva λειτουργεί με μια διαδικασία που ονομάζεται χηλικοποίηση. Αφού λάβετε το Deferasirox/Teva, αυτό εισέρχεται στο αίμα σας και «δεσμεύει» τις επιπλέον ποσότητες σιδήρου που συναντά.

Γιατί μου συνταγογραφήθηκε αυτό το φάρμακο;

Πολλές παθήσεις χρειάζονται μεταγγίσεις. Μερικές από αυτές είναι:

- Μείζων β-θαλασσαιμία – μια κληρονομική διαταραχή του αίματος κατά την οποία οι ασθενείς δεν έχουν αρκετή φυσιολογική αιμοσφαιρίνη στο αίμα
- Δρεπανοκυτταρική αναιμία – μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων που επηρεάζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία παράγουν ερυθρά αιμοσφαίρια ασυνήθιστου σχήματος που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα επειδή δεν ζουν όσο τα υγιή **αιμοσφαίρια και μπορεί να κολλήσουν στα αιμοφόρα αγγεία**
- **Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS)** – μια διαταραχή του αίματος που προκαλεί μείωση του αριθμού των υγιών αιμοσφαιρίων
- Άλλες αναιμίες (χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα)

Αριθμός έκδοσης: 1.0

Ημερ. έγκρισης ΕΟΦ: Φεβρουάριος 2025

Εάν έχετε κάποια από τις παραπάνω παθήσεις, πιθανώς να έχετε ήδη υποβληθεί σε μερικές μεταγγίσεις. Οι μεταγγίσεις περιέχουν τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια που χρειάζεται το σώμα σας και μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα.

Το Deferasirox/Teva χρησιμοποιείται επίσης όταν η θεραπεία με δεφεροξαμίνη αντενδείκνυται ή είναι ανεπαρκής για την θεραπεία ασθενών ηλικίας 10 ετών και άνω οι οποίοι έχουν υπερφόρτωση σιδήρου που σχετίζεται με τα σύνδρομα μεσογειακής αναιμίας από τα οποία πάσχουν αλλά δεν εξαρτώνται από μεταγγίσεις.

Κάθε μετάγγιση που σας χορηγείται περιέχει σίδηρο. Ο σίδηρος είναι σημαντικός επειδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια τον χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα σας. Ωστόσο, το σώμα δεν έχει τον δικό του τρόπο να απομακρύνει τον επιπλέον σίδηρο. Η ποσότητα σιδήρου συσσωρεύεται με κάθε μετάγγιση. Αυτό δημιουργεί περίσσεια σιδήρου στο σώμα σας, που ονομάζεται χρόνια υπερφόρτωση σιδήρου. Υπερφόρτωση σιδήρου μπορεί, επίσης, να αναπτυχθεί, με την πάροδο του χρόνου, σε ασθενείς με σύνδρομα μεσογειακής αναιμίας, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από μεταγγίσεις, κυρίως λόγω αυξημένης απορρόφησης σιδήρου μέσω της διατροφής ως απάντηση στο χαμηλό αριθμό αιμοσφαιρίων. Η υπερβολική ποσότητα σιδήρου μπορεί να είναι επιβλαβής και να βλάψει όργανα όπως η καρδιά και το ήπαρ σας. Είναι σημαντικό να απομακρύνετε τον πλεονάζοντα σίδηρο προκειμένου να διατηρήσετε την ποσότητα του σιδήρου στο αίμα σας σε ένα ασφαλές, υγιές επίπεδο.

Πώς παίρνω το Deferasirox/Teva;

Είναι σημαντικό να παίρνετε το φάρμακό σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Τι δόση θα πάρω;

Η συνταγογραφούμενη δόση του Deferasirox/Teva βασίζεται στο βάρος σας, στο τρέχον επίπεδο σιδήρου, στη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών και στο πόσο συχνά κάνετε μεταγγίσεις. Εάν αλλάζετε από τις εγχύσεις δεφεροξαμίνης σε Deferasirox/Teva, ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει τη δόση Deferasirox/Teva με βάση την ποσότητα δεφεροξαμίνης που λαμβάνετε.

Ποιο(α) δισκίο(α) θα πάρω;

Το Deferasirox/Teva διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη δισκίων και ενδέχεται να χρειάζεται να λαμβάνετε περισσότερα από ένα. Ο γιατρός σας θα σας πει πόσα δισκία και τι μεγέθους πρέπει να λαμβάνετε κάθε μέρα.

Το Deferasirox/Teva διατίθεται μόνο σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και όχι σε διασπειρόμενα δισκία. Για τα διασπειρόμενα δισκία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες σχετικά με τη δόση.

Πότε θα λαμβάνω το Deferasirox/Teva;

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Deferasirox/Teva πρέπει να λαμβάνονται μία φορά την ημέρα, κατά προτίμηση την ίδια ώρα κάθε μέρα, και μπορούν να λαμβάνονται με άδειο στομάχι ή μετά από ελαφρύ γεύμα.

Πώς θα λαμβάνω το Deferasirox/Teva;

Τα δισκία Deferasirox/Teva πρέπει να λαμβάνονται ολόκληρα με λίγο νερό. Για ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν ολόκληρα δισκία, τα δισκία Deferasirox/Teva μπορούν να θρυμματιστούν και να χορηγηθούν διασπείροντας την πλήρη δόση σε μια μικρή ποσότητα μαλακής τροφής, όπως γιαούρτι ή σάλτσα μήλου (πολτός μήλου). Η δόση πρέπει να καταναλώνεται πλήρως και αμέσως, και να μην φυλάσσεται για μελλοντική χρήση.

Τι συμβαίνει αν ξεχάσω να πάρω τη δόση μου;

Εάν παραλείψετε να πάρετε μια δόση Deferasirox/Teva , θα πρέπει να την πάρετε όταν το θυμηθείτε, ακόμα κι αν είναι αργότερα μέσα στην ημέρα. Πάρτε την επόμενη δόση σας όπως έχει προγραμματιστεί.

Μην πάρετε διπλή δόση την επόμενη ημέρα για να αναπληρώσετε τα δισκία που ξεχάσατε.

Τι θα συμβεί αν πάρω περισσότερα δισκία Deferasirox/Teva από όσα θα έπρεπε;

Εάν πάρετε περισσότερα δισκία Deferasirox/Teva από όσα θα έπρεπε, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή επικοινωνήστε με νοσοκομείο, καθώς ενδέχεται να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική βοήθεια. Μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια , ναυτία και έμετο και προβλήματα στα νεφρά ή το ήπαρ που μπορεί να είναι σοβαρά.

Πώς θα παρακολουθείται η θεραπεία μου;

Κατά τη λήψη του Deferasirox/Teva , θα κάνετε τακτικές εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις θα παρακολουθούν πώς ανταποκρίνεστε στη θεραπεία. Η δόση σας μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί.

Εξέταση	Πριν ξεκινήσετε το Deferasirox/Teva	Κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας	Μία φορά το χρόνο
Σίδηρος Ποσότητα σιδήρου στο σώμα σας (επίπεδα φερριτίνης στο αίμα)	✓	✓	
Λειτουργία των νεφρών Επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα	✓ Αυτή η εξέταση θα πραγματοποιηθεί 2 φορές πριν την έναρξη του Deferasirox/Teva	✓ Κατά τον πρώτο μήνα και κάθε πρώτο μήνα μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στη δόση θα ελέγχετε μία φορά την εβδομάδα. Στη συνέχεια μία φορά το μήνα.	
Κάθαρση κρεατινίνης (για να εκτιμηθεί πόσο καλά λειτουργούν τα νεφρά σας)	✓	✓ Κατά τον πρώτο μήνα και κάθε πρώτο μήνα μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στη δόση θα ελέγχετε μία φορά την εβδομάδα. Στη συνέχεια μία φορά το μήνα.	
Ούρα Πρωτεΐνη στα ούρα	✓	✓	
Ηπατική λειτουργία Επίπεδα τρανσαμινασών, χολερυθρίνης, αλκαλικής φωσφατάσης στο αίμα	✓	✓ Τον πρώτο μήνα θα ελέγχετε κάθε 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια μία φορά το μήνα.	
Ακοή και όραση	✓		✓

Σωματικό βάρος, ύψος και σεξουαλική ανάπτυξη	✓		✓ Ετησίως σε παιδιατρικούς ασθενείς
---	---	--	-------------------------------------

Ο γιατρός σας ενδέχεται επίσης να πραγματοποιήσει:

- Εξέταση μαγνητικής τομογραφία ή **MRI**, για να ελέγξει τα επίπεδα σιδήρου στην καρδιά ή το ήπαρ σας
- Βιοψία των νεφρών σας εάν υποψιάζεται σημαντική νεφρική βλάβη
- Εξετάσεις άλλων δεικτών που σχετίζονται με τη λειτουργία των νεφρικών σωληνάρων (όπως γλυκοζουρία σε μη διαβητικούς και χαμηλά επίπεδα καλίου, φωσφόρου, μαγνησίου ή ουρικού του ορού, φωσφατουρία, αμινοξουρία) εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Αυτό το φάρμακο έχει ανεπιθύμητες ενέργειες;

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Deferasirox/Teva μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν τις παρουσιάζουν όλοι οι ασθενείς. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες έως μέτριες και γενικά θα εξαφανιστούν μόλις συνηθίσετε τη θεραπεία. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες ή εβδομάδες.

Οι πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν: διαταραχές στις εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας, ενώ οι συχνές περιλαμβάνουν: ναυτία, έμετο, διάρροια, πόνο στην κοιλιά, φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, δερματικό εξάνθημα, πονοκέφαλο, κνησμό, διαταραχή των δοκιμασιών ηπατικής λειτουργίας και των εξετάσεων ούρων (πρωτεΐνη στα ούρα).

Η λειτουργία των νεφρών και του ήπατος θα ελεγχθεί πριν ξεκινήσετε το Deferasirox/Teva και θα παρακολουθείτε τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. (Δείτε τον πίνακα στην προηγούμενη σελίδα).

Να θυμάστε:

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια εμφανίσετε. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ΔΙΑΚΟΨΤΕ αμέσως τη λήψη του φαρμάκου και ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Τι γίνεται με τα άλλα φάρμακα;

Το Deferasirox/Teva δεν πρέπει να λαμβάνεται με άλλους χηλικούς παράγοντες σιδήρου.

Τα αντιόξινα (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καούρας) που περιέχουν αργίλιο δεν πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα με το Deferasirox/Teva.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει πρόσφατα άλλα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει και φάρμακα που λαμβάνετε χωρίς ιατρική συνταγή. Ο γιατρός σας ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσει εργαστηριακές εξετάσεις για την παρακολούθηση αυτών των φαρμάκων.

Η πρόοδός μου με το Deferasirox/Teva

Ο θεραπευτικός μου στόχος

Αριθμός έκδοσης: 1.0

Ημερ. έγκρισης ΕΟΦ: Φεβρουάριος 2025

Ο στόχος της θεραπείας με Deferasirox/Teva είναι να έχετε μια σωστή ποσότητα σιδήρου στο σώμα σας. Κάθε μήνα θα επισκέπτεστε το γιατρό σας για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας ως προς τον θεραπευτικό σας στόχο.

Ο γιατρός σας θα θέσει το στόχο της θεραπείας σας με βάση τα αποτελέσματα μιας εξέτασης φερριτίνης αίματος. Αυτή η εξέταση δείχνει το τρέχον επίπεδο φερριτίνης σας και ενημερώνει τον γιατρό σας σχετικά με την ποσότητα σιδήρου που υπάρχει στο σώμα σας. Ο γιατρός σας θα θέλει είτε να μειώσει το επίπεδο φερριτίνης σας είτε να το διατηρήσει σταθερό.

Δοσολογία Deferasirox/Teva

Ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να αλλάξει τη δόση σας με βάση το επίπεδο φερριτίνης σας, τις άλλες εργαστηριακές εξετάσεις ή το πόσο συχνά κάνετε μεταγγίσεις.

Μετά τη λήψη του Deferasirox/Teva για διάστημα 3 έως 6 μηνών, ελέγξτε με το γιατρό σας ότι σημειώνετε πρόοδο όπως έχει προγραμματιστεί. Εάν δεν σημειώνετε, συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με το σχέδιό του/της προκειμένου να σας βοηθήσει να επιτύχετε τον θεραπευτικό σας στόχο.

Μεταξύ των επισκέψεων

Άλλα σημαντικά γεγονότα μπορεί να προκύψουν μεταξύ των επισκέψεων στο γιατρό, τα οποία θα πρέπει να τα καταγράφετε και να τα μοιράζεστε με το γιατρό σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- Ανεπιθύμητες ενέργειες
- Λήψη άλλων φαρμάκων
- Οποιαδήποτε απόκλιση από τη συνταγογραφούμενη δόση

Πώς να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια από το **Deferasirox/Teva** (δεφερασιρόξη), ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, που δεν αναφέρεται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχωρήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του **Deferasirox/Teva** (δεφερασιρόξη) απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

- Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ <http://www.eof.gr/> ή απευθείας στο <https://www.kitrinikarta.gr/>
- Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040337.
- Μπορείτε επίσης να σαρώσετε μέσω του «έξυπνου» κινητού σας τον παρακάτω κωδικό QR, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://www.eof.gr>, για τη συμπλήρωση της «ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ».



Εναλλακτικά οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στο Τμήμα
Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας:

Teva Pharmaceuticals Hellas A.E.

Λ. Κηφισίας 44 • 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: + 30 211 880 5166

Email: Safety.Greece@tevaeurope.com